



LabSoluções Laboratório de Análises Clínicas

Informações de Exames

Código	Exame	Material	Sinônimos
SCL70	ANTI – SCL – 70	SORO	ANTI-TOPOISOMERASE, CBHPM - 40306291

Interpretação:

Anticorpo que reconhece a porção carbóxi-terminal da DNAtopoisomerase I. Está presente em percentual que varia de 22 a 40 % dos pacientes com esclerodermia com tendência a generalizar ou com acometimento sistêmico, em especial comprometimento pulmonar com fibrose e cardíaco, além de pontos hemorrágicos de extremidades. Marca a doença de longa evolução. Pode ser encontrado no lúpus eritematoso sistêmico e mais raramente na dermatomiosite e artrite reumatóide. Pode ser representado por FAN nuclear e nucleolar de padrões mistos.

Produção do exame:

Volume mínimo:	2 mL
Prazo:	3 dias úteis
Realização:	Quinta-feira
Meio(s) de coleta:	Tubo seco (vermelho) ou Gel separador (amarelo)

Instruções de preparo:

Jejum aconselhável de 4 horas.

Instruções de distribuição:

Transportar refrigerado (2 a 8 °C)

Instruções de rejeição:

A amostra é estável por até 5 dias refrigerada de 2 a 8 °C

Amostras sem identificação, com contaminação bacteriana, alto grau de hemólise, icterícia, lipemia e que sofreram tratamento térmico serão rejeitadas.